

プロトンポンプ阻害薬 (PPI)



この文言を見かけたら、「よく効くかも！」ではなく、「副作用のリスクが大きくて危険」と思うこと。

主成分【ランソプラゾール】の副作用

主な副作用

下痢、味覚異常、軟便、発疹、AST上昇、ALT上昇、発熱、大腸炎、血便、腹痛、胃食道逆流

重大な副作用

貧血、顆粒球減少、血小板減少、尿細管間質性腎炎、急性腎障害、視力障害、アナフィラキシー、全身発疹、顔面浮腫、呼吸困難、ショック、汎血球減少、無顆粒球症、溶血性貧血、黄疸、重篤な肝機能障害、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、間質性肺炎、咳嗽、肺音異常、捻髪音

上記以外の副作用

そう痒、Al-P上昇、LDH上昇、γ-GTP上昇、好酸球増多、便秘、口渇、腹部膨満感、collagenous colitis、下痢が継続、腸管粘膜縦走潰瘍、腸管粘膜びらん、腸管粘膜易出血、下血、悪心、嘔吐、食欲不振、口内炎、頭痛、眠気、うつ状態、不眠、めまい、総コレステロール上昇、尿酸上昇、倦怠感、しびれ感、胸やけ、ビリルビン上昇、好中球減少、白血球増多、トリグリセライド上昇、総コレステロール低下、尿蛋白陽性、血糖陽性、排便回数増加、過敏症、多形紅斑、亜急性皮膚エリテマトーデス、舌炎、かすみ目、脱力感、関節痛、低ナトリウム血症、低マグネシウム血症、低カリウム血症、低カルシウム血症、浮腫、カンジダ症、振戦、女性化乳房、舌のしびれ感、口唇のしびれ感、四肢のしびれ感、筋肉痛、脱毛

H2ブロッカー



主成分【ファモチジン】の副作用

主な副作用

白血球減少、便秘、Al-P上昇、痙攣、徐脈、頻脈、房室ブロック、肝機能異常、可逆性の錯乱状態、うつ状態、めまい

重大な副作用

呼吸困難、再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症、溶血性貧血、全身倦怠感、脱力、皮下出血、粘膜下出血、発熱、中毒性表皮壊死融解症、Toxic Epidermal Necrolysis、TEN、皮膚粘膜眼症候群、Stevens-Johnson症候群、肝機能障害、黄疸、AST上昇、ALT上昇、横紋筋融解症、高カリウム血症、ミオグロビン尿、著明な血清逸脱酵素上昇、筋肉痛、QT延長、意識障害、全身痙攣、痙直性痙攣、間代性痙攣、ミオクロヌス性痙攣、間質性腎炎、急性腎障害、皮疹、腎機能検査値異常、BUN上昇、クレアチニン上昇、間質性肺炎、咳嗽、胸部X線異常、不全収縮、ショック、アナフィラキシー、全身潮紅、血管浮腫、顔面浮腫、咽頭浮腫、蕁麻疹、血小板減少

上記以外の副作用

乳汁漏出症、CK上昇、味覚異常、背部痛、過敏症、発疹、紅斑、好酸球増多、下痢、軟便、口渇、悪心、嘔吐、腹部膨満感、食欲不振、口内炎、血圧上昇、顔面潮紅、耳鳴、総ビリルビン上昇、LDH上昇、無気力感、頭痛、眠気、不眠、月経不順、女性化乳房

一時しのぎで飲んだ胃薬が全身を蝕む
本来の副作用欄を見てしまったなら、大抵の人はその薬を飲まないであろう。
「胸やけ」「胃もたれ」などを解消したいがために、とんでもない副作用を被るリスクを背負うことになる。
胃酸は重要であるため、抑えようとしてはならない。

防御因子増強薬



主成分【テプレノン】の副作用

主な副作用

血小板減少、便秘、下痢、嘔気、口渇、腹痛、腹部膨満感、頭痛、過敏症、発疹、そう痒感

重大な副作用

肝機能障害、黄疸、AST上昇、ALT上昇、γ-GTP上昇、Al-P上昇

上記以外の副作用

総コレステロール上昇、眼瞼発赤、眼瞼熱感